


화이트필 정

박스

종이    뷰티팩 350g  
인쇄    단면인쇄  
         별색2도 + 먹1도  
코팅    CR 코팅

■ Pantone 9440 U  
■ Pantone 4281 U





화이트필 정

박스

종이    뷰티팩 350g  
인쇄    단면인쇄  
         별색1도 + 먹1도  
코팅    CR 코팅

■ Pantone 4281 U





# 화이트필 정

## 박스 봉합 스티커

### 포장시 요청사항

투명원형봉합스티커 25mm

양옆 부착 2개




박스 하단 양옆 부착

# 화이트필 정

## 타공있는 부분

서랍열시

하썈 글씨있는 쪽에 끼워져야함




화이트필 정

삽지

종이    백색 모조지 80g  
인쇄    양면인쇄  
          별색2도 + 먹  
접지    6단접지

- Pantone 9440 U
- Pantone 4281 U
- Black 80%

삽지 부분에 상단  
배경높이에 최대한 맞춰서  
접지 부탁드립니다.



236mm

WHITE PEEL TABLET

Denps

화이트필 정

제품명	화이트필 정
구분/분류번호	의약품 / 4721 (저항성 비타민 미네랄 제제)
성상	흰색의 정방형 필름코팅정
원료약품 및 분량	1정 중 유효성분 : 아스코르브산(U5P) 500 mg, L-아스코르비나트(LIP) 120 mg, 토포페롤아세테이트(2에산염) 25 mg(비타민E로서 12.5 IU), 이노시톨(KP) 20 mg, 산화아연(KP) 10.6 mg(아연으로서 8.5 mg), 니코틴아미드(KP) 10 mg, 판토텐산칼슘(KP) 10 mg, 티아민질산염(KP) 10 mg, γ-오리자놀(KP) 5mg, 피리독신 염산염(KP) 3mg, 리보플라빈(KP) 3mg, 비오틴(U5P) 0.5 mg 첨가제(기타) : 미결정셀룰로오스, 스타렘, 스테아르산마그네슘, 오파드라이AMB II(흰색(88A180021), 오파드라이온색(fx63F97546), 오파드라이투명색(EZ254U590005), 오파드라이흰색(20A680000), 이산화규소, 크로믹시메틸셀룰로오스, 글루, 락토실로보오스
효능효과	1. 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후의 체력저하 시 비타민 B <sub>1</sub> , B <sub>6</sub> , B <sub>12</sub> , C의 보급 2. 기미·주근깨의 완화 3. 노년기의 비타민E 보급 4. 아연의 보급
용법용량 지장방법	만 14세 이상의 어린이 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 가임용기에 식사공선을 피해 실온의 건조한 곳에 보관합니다.
포장정보 사용기한 제조자 판매자 기타 표시사항	28정 / PTP 케이스 별도 표시일 참조 취시용 : 총정복도 정주시 흡착구 오송음 오송생명도 61 취시용 : 총정복도 정주시 흡착구 오송음 오송생명도 115 본 의약품은 KGM(의약품) 제제 및 품질관리기준 적합업체에서 생산하여 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손한 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 이 약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다. 의약품 중독증상, 의약품 허가 변경사항 등 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(http://medrug.mfds.go.kr)의 의약품 등 정보란을 참조하시기 바랍니다. 부작용 보고 : 한국약품안전관리원 (044-6222 또는 14-3330) 소비자상담 : 1566-5203 문서작성일자 : 2023.07.06

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.  
1) 이 제품 및 이 제품에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자  
2) 만 3개월 미만의 영아 3만 1세 미만의 영아  
2. 다음 경우에는 신중히 투여하십시오.  
(복용 전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)  
1) 의사의 지시를 받고 있는 환자 2) 과수산노증환(hyperoxaluria : 노증에 과량의 수산염이 배설되는 상태)  
3) 임부, 수유부 4) 심장·순환기계 기능장애 환자  
5) 신장에 환자 6) 저단백혈증 환자  
3. 부작용 1) 이 제품의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다. - 위부 불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발치, 구역, 구토, 몸은 변, 위장관장애, 소화장애, 심박부동증, 구역질, 저혈압, 폐부종 2) 이 제품의 투여에 의하여 생기가 예전보다 떨어지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다. 3) 테스트로 캔을 포함한 경우를 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자 4) 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가할 수 있습니다. 5) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다. 6) 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병증 증상(neuropathy) 및 조산성증의 기능적 장애 또는 병적변화(이 나타날 수 있습니다. 6) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산염증(hyperursemia, 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다. 7) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성 심부전, 방광 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 4. 일반적 주의 1) 정해진 용법·용량을 지킵니다. 2) 어린이에 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 투여합니다. 3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의합니다. 5. 상호작용 1) 항알도스테론제, 트리글리세린 병용투여시 고칼혈증증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오. 2) 이 제품을 투여할 경우에는 다음의 약제를 투여하지 마십시오. - 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제, 제산제 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전후에는 피해야 합니다. 6. 임부·수유부, 미숙아, 유아에 대한 투여 1) 만 3개월 미만의 영아에게는 투여하지 마십시오. 2) 만 1세 미만의 영아에게는 투여하지 마십시오. 7. 임상시험시점의 영향 1) 각종 노년기에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다. 2) 오줌을 황색으로 변하게 하여 임상시험시점에 영향을 줄 수 있습니다. 8. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다. 2) 식사공선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀폐하여 보관합니다. 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

23-07 www.denps.com