

# WHITE PEEL TABLET

Denps

화이트필 정

제품명	화이트필 정
구분/분류번호	의약외품 / 4721 (저함량 비타민 미네랄 제제)
성상	흰색의 장방형 필름코팅정
원료약품 및 분량	1정 중 유효성분 : 아스코르브산(USP) 500 mg, L-시스테인(JP) 120 mg, 토코페롤아세테이트2배산(EP) 25 mg(비타민E로서 12.5 I.U.), 이노시톨(KP) 20 mg, 산화아연(KP) 10.6 mg(아연으로서 8.5 mg), 니코틴산아미드(KP) 10 mg, 판토텐산칼슘(KP) 10 mg, 티아민질산염(KP) 10mg, γ-오리자놀(KP) 5mg, 피리독신염산염(KP) 3 mg, 리보플라빈(KP) 3 mg, 비오틴(USP) 0.5 mg 첨가제(기타) : 미결정셀룰로오스, 스타탭, 스테아르산마그네슘, 오파드라이AMB II 흰색(88A180021), 오파드라이은색(fx63F97546), 오파드라이투명색(EZ254U590005), 오파드라이흰색(20A680000), 이산화규소, 카르복시메틸셀룰로오스 칼슘, 히프로멜로오스
효능효과	1. 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후의 체력저하 시 비타민 B <sub>1</sub> , B <sub>2</sub> , B <sub>6</sub> , C의 보급 2. 기미·주근깨의 완화 3. 노년기의 비타민E 보급 4. 아연의 보급
용법용량 저장방법	만 14세 이상의 어린이 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 기밀용기에 직사광선을 피해 실온의 건조한 곳에 보관합니다.
포장정보	28정/PTP
사용기한	케이스 별도 표시일 참조
제조사	(주)서흥 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61
판매자	(주)에이치피오(H.PIO) : 서울시 영등포구 양평로 115
기타 표시사항	* 본 의약외품은 KGMP(의약외품 제조 및 품질관리기준) 적격업체에서 생산하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. * 이 약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다. * 의약품 용어설명, 의약품 허가 변경사항 등 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템( <a href="http://nedrug.mfds.go.kr">http://nedrug.mfds.go.kr</a> )의 의약품 등 정보검색을 참조하시기 바랍니다. * 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원 (1644-6223 또는 14-3330) * 소비자상담실 : 1566-5203 * 문서작성일자 : 2023.07.06

## 사용상의 주의사항

### 1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 제품 및 이 제품에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 만 3개월 미만의 영아 3) 만 1세 미만의 영아

### 2. 다음 경우에는 신중히 투여하십시오.

(복용 전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 과수산뇨증환(hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 3) 임부, 수유부 4) 심장·순환기계 기능장애 환자
- 5) 신장애 환자 6) 저단백혈증 환자

**3. 부작용** 1) 이 제품의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다. - 위부 불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 묽은변, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 구역질, 저혈압, 폐부종 2) 이 제품의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다. 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다. 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다. 5) 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다. 6) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperurisemia, 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다. 7) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성 심부전, 부종 등의 증상이 나타날 수 있습니다.

### 4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 지킵니다. 2) 어린이에 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 투여합니다. 3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의합니다.

### 5. 상호작용

- 1) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오. 2) 이 제품을 투여할 경우에는 다음의 약제를 투여하지 마십시오. - 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 - 레보도파 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전후에는 피해야 합니다.

### 6. 임부·수유부, 미숙아, 유아에 대한 투여

- 1) 만 3개월 미만의 영아에게는 투여하지 마십시오.
- 2) 만 1세 미만의 영아에게는 투여하지 마십시오.

### 7. 임상검사치에의 영향

- 1) 각종 뇨검사 시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- 2) 오줌을 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

### 8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다. 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.